

# 种植小浆果

## 种植小浆果

自己种植收获水果很有成就感。除了吃新鲜水果，还可以用它们做果酱，西点和泡菜。哪怕很小的花园都可以种一些水果，这样你能享受到超市里还没上架的时鲜。

很多小株的水果植物都比较好打理。覆盆子，高灌蓝莓，红加仑，黑加仑，和醋栗都是浆果的代表。它们是灌木。

### 可食用的景观

水果灌木在花园里可以作为美化植物或者围栏。

萨斯卡通莓有很好的防风作用，接骨木果可以作为防风墙。

像加仑这种小灌木可以作为观赏性灌木或者篱笆。玫瑰灌木或者醋栗可以作为围栏，因为它们多刺。

葡萄和狗枣猕猴桃的美丽藤条可以为你的果园增加垂直装饰，爬满篱笆，甚至长成绿色屏障，果实也香甜可口。

草莓植物可以代替草地作为地被覆盖。

## 在哪种植

每日至少有 8 小时光照的地方能让水果的产量达到最高。

醋栗和加仑能够耐受部分阴凉，高灌蓝莓只能耐受一点点遮阴。无论冬夏，把植物种在不受强风的地方。如果排水不太好就把它种在小坡上。面北的坡比较凉爽，适合醋栗和加仑。避免把植物种在低洼地带，因为晚发的霜冻会危害花期导致水果减产。

离建筑物或者大树近的土壤很干。如果有浆果种在这样的环境里，夏天的时候要保持一个月给它们浇两次水。

接骨木果喜欢潮湿的土壤还可以承受偶尔的淹没。

## 怎样种植

尽可能在早春土壤比较干燥的时候就开始种植。这样给植物充分时间在第一个寒冬来临之前建立根系。

排水好、有机物含量高的土壤，酸碱值在 6 到 6.5 之间对大多说水果都是理想的生长环境，有的高灌蓝莓偏爱酸碱值 5.5 左右的土壤。大多数植物店都有卖可以测试土壤酸碱值的工具。一般来说，避免往土里加石灰来增加碱性（石灰会让土壤 PH 值增加）。

草莓在植物床里生长得较好。植物床的排水情况理想，也有更多的空气流通防止果实腐烂或者生虫。种高灌蓝莓时，如果生长土壤大多是粘土，也应该栽培在植物床里。

如果种植植物挖掉了草皮，可以把草皮分散放到坑的底部。把大约 5 厘米的有机肥或者旧置的粪肥混合进植穴的土壤里。把植物的根梳理开再放到植穴里。

挖坑种植灌木类的或者攀藤类的水果植物时，坑应该比买来盆栽的盆子大两倍，但是只稍微深一点。

把植物的根尽量散开。如果根在盆子里缠得很紧，一定要在种植的时候把他们舒展开来。可以把盘根泡在一桶水里舒展它们或者用刀把盘根的外部划开。

调整植物到适合的种植深度：

- 葡萄和各种加仑要比从苗圃买来时的种植盆埋深 2.5 厘米。

- 黑莓和覆盆子的根要埋在土壤 7 厘米以下。种植的时候把它们的茎剪到出土壤 20 厘米。
- 种草莓时土壤应该盖到长叶的根节处。
- 大黄的芽尖应埋在土壤下 6 厘米。
- 种植物时，先给植穴填一部分土，彻底浇水浸湿。
- 加入剩下的土壤后再次浇水。
- 之后的第一个月每周给新种的植物浇两次水。
- 第二个月到 8 月中旬每月给植物浇两次水。

杂草限制植物生长，导致水果减产。以下是除杂草的步骤：

- 种植以后，在土表层铺一层 5 厘米厚的肥料或者久置的粪肥，一直铺到滴水线（树枝的末端）；
- 把波纹纸板盖在肥料上；
- 波纹纸板上撒上护根的干草，碎树皮，海草，木削或者树叶垫。树叶垫的做法是冬天将树叶放在袋子里敞开。春天就可以去除压实的树叶垫了。

## 打理照料

如果种植方法恰当再加上好的保护层覆盖，浆果不需要太多打理。

### 春天

每个春天耙开护根层撒上更多的肥料。

如果杂草在植物根茎附近冒出，放上更多的波纹纸板。

如果护根层太薄了就再加一层。

### 夏天

如果夏天很干，在植物开花和结果时浇水一定要浇透。直到附近的地面有小水坑时就说明根和附近土壤都喝饱了。

### 秋天

秋天把树叶收集在袋子。整个冬天把袋子敞开让它继续收集雨和雪。春天就可用压实的树叶垫作为保护层了。

### 冬天

土里冻结以后，给草莓床盖上一层 30 厘米的保护覆盖层。可以用橡木树叶，枯草或者针叶树枝做成保护覆盖层。

## 怎样打理草莓繁殖苗地

两到三岁的草莓植物结的果实最好。有两种方式打理草莓让它们产量最优：

- 如果空间足够，选三块繁殖苗地分别种一岁，两岁，三岁的草莓植物。每年在一块苗地种植，另外一块苗地收获，收获以后移除植物。
- 三岁的草莓植物结果后马上把它从繁殖地挖出。在土里加入有机肥或者久置的粪肥，从剩下的草莓丛里选一些匍匐茎移植到土壤里。

剪掉母本植物绝大部分的匍匐茎只留 5 个。留着的 5 个匍匐茎待小叶苗长处以后都剪掉。

## 促进大黄生长

如果茎太弱小，植物不是缺养料就是种植太紧密。春天在幼苗根颈（地面上根茎结合的地方）的周围撒上一层 7 至 10 厘米的久置的粪肥，看对茎的长粗有没有帮助。

如果根太紧密或者植物太老了就需要在初春的时候把它挖出来分成几块。把每个根颈切成两 three 块。重新种植在大一点的坑里，每个间距 1 米。在种植前坑里加两三铁铲的粪肥或者有机肥。种植深度应该让土壤没过小芽 5 厘米。

## 修枝的要领

### 早春叶子长出之前

**黑莓** – 齐地剪掉去年结过果子的两年新的枝条。如果发现生病的枝条，把它们埋掉或者烧掉。

**黑加仑** – 从离地 2.5 厘米的地方修剪掉三年以上的，或者弱小的，末端枯萎或低垂的枝条。剩下的应该是浅色的一年新枝和两岁的伸展开的枝条。

**蓝莓** – 剪掉死的，断的和打结的枝条。有些老枝结的果实不太好，应该修剪到只留直立的健康的部分，有的应该齐地剪掉。

**接骨木果** – 剪掉死的，生病的，受损的或打结的枝条。

**醋栗** – 剪掉弱小的或者四五年以上的枝条。把一年新的枝条截去一半。

**葡萄** – 成熟的葡萄植物需要把去年的枝条修剪到只剩两到三个健康的枝芽。

**狗枣猕猴桃** – 除了去除死的枝条外基本不需要修剪。

**桑葚** – 剪枝时会流出很多树汁，只修剪死的或者打结的枝条。

**覆盆子** – 像修剪黑莓那样修剪夏天要结果实的枝条。秋天结果的枝条在春天时应齐地剪断。

**红加仑和白加仑** – 它们在老的纸条上结的果更好。只需要修剪五年以上的枝条，留 8 到 10 根主枝。

**萨斯卡通莓** – 剪掉死的，生病的，受损的或打结的枝条。

## 夏天

**黑莓** – 如果需要，结出果实以后可以立即修剪。修剪要领和春季修剪相同。

**黑加仑** – 如果需要，结出果实以后可以立即修剪。修剪要领和春季修剪相同。

**醋栗** – 把新从地面长出的枝从茎节以上剪掉，留 5 片叶子。这样会促进植物更好的开花，结果。

**覆盆子** – 如果需要，结出果实以后可以立即修剪。修剪要领和春季修剪相同。

**红加仑** – 把新从地面长出的枝从茎节以上剪掉，留 5 片叶子。这样会促进植物更好的开花，结果。

**白加仑** – 把新从地面长出的枝从茎节以上剪掉，留 5 片叶子。这样会促进植物更好的开花，结果。

## 花和果实

植物只有开花以后才会结果。以下原因可能导致植物无花或少花：

- 太多遮阴(把植物移到阳光更多的地方)

- 酸碱度不对(测试土壤酸碱值; 应该在 6.0 到 6.5 之间)
- 土壤排水不好(种到种植床上)
- 种得太深(挖掉一些土, 或者挖出重种)
- 硫或者钾不够(土里加一点鱼骨粉和海草), 或者氮太多(减少施粪肥或者有机肥)
- 植物太小了(耐心等待).

如果只有花没结果, 可能是早春的霜冻损害了花, 或者因为蜜蜂太少没能授粉, 风雨影响了蜜蜂的数量或者气候过冷。

初种小苗时, 最好让它们多长茎和叶而不是花和果实。高灌蓝莓第一年的花都应该被剪掉以促进植物本身的生长。

## 繁殖小浆果

黑莓, 红白加仑, 接骨木果和醋栗很容易从灌木的枝条开始培育。秋天叶子颜色变了以后, 剪几枝新枝种在土里, 树枝会越来越长越好。(桑葚从地面截断枝条。)

- 以 45 度角把枝条插进土里(减小冻胀的危害), 3/4 的长度埋在土里。
- 土结冻以后, 把土面铺上一层后后的干草或者常绿树枝或者橡树枝。
- 春天来了, 修剪过的枝条会不断的长新叶, 新叶也会长大。把它们移植到苗床里, 三年以后移植到它们最终的种植地点。

黑莓和覆盆子的培育可以从伏地茎上的小苗开始。早春的时候把这些小苗挖出来移植到另一个地方。

高灌蓝莓可以剪一段根开始培植。把根切成 3 到 10 厘米长, 6 到 12 毫米的截面直径。底部切斜一点, 这样就可以分清哪一头是朝上长得。把切好的根垂直的放在刨松的透水性好的土里, 或者用盆栽土。把主根上分出来的小根平放号然后盖上一小层土。

狗枣猕猴桃的繁殖可以在仲夏的时候用半成熟枝扦插(枝底部很结实, 但是枝尖还很嫩)。葡萄繁殖可以用成熟枝扦插, 插芽(短的根), 或者压条繁殖。

接骨木果, 醋栗, 萨斯卡通莓和所有的加仑都可以很容易压条繁殖。

在早春或者夏末的时候，把一根枝条压弯放在土里。离枝末 12 到 25 厘米的地方把皮刮掉，然后把那个部分放在土里。在图上铺一层薄的粪肥。

在上面放块石头，或者用铁丝把那个枝条部分固定在土里。来年春天把新形成的根部和母体植物分离，把它移植到苗床里。

## 种植信息

水果	一人份水果 所需的植物数	植物个体间距 x 行间距 ( cm )
黑莓	1	200 x 200
黑加仑	1	150 x 300
蓝莓 - 高灌	2	200 x 200
蓝莓 - 矮灌	6	50 x 100
接骨木果	1/2	200 x 300
醋栗	1	150 x 300
葡萄	1	200 x 300
狗枣猕猴桃	1	150 x 300
桑葚, 垂柳桑葚	1/2	200 x 200
覆盆子	10	60 x 120
红加仑	1	150 x 300
大黄	1	100 x 100
萨斯卡通莓	1	200 x 300
草莓	25	30 x 60
白加仑	1	150 x 300

### 注释:

种植覆盆子时，每排植物需要 30 厘米的宽度，排内植物间距 60 厘米，排与排之间隔开 120 厘米。

每株公种狗枣猕猴桃（给母种授粉）最多能够搭配九株母狗枣猕猴桃（结果）。由于软枣猕猴桃长得太快太大，只适合很大的果园。所以狗枣猕猴桃更受家庭青睐，因为它们较小株也比较早结果实。

种植两个品种的蓝莓和接骨木果用于授粉

在社区推广乡村传统